



Grandes
Cultures

Avertissements agricoles auvergne

Bulletin technique N° 9 du 22/05/1997



BLE

Maladies : Traitement septoriose à envisager surtout dans l'Allier.

Pucerons : A surveiller.

TOURNESOL

Phomopsis : Progression de la maturation des périthèces.

Pucerons : A surveiller.

BLE

Stades : Début épiaison (10-2) à floraison (10-5-2)

Maladies

✓ **La septoriose :** Peu d'évolution en 8 jours. Encore très peu de symptômes sur les feuilles hautes mais les pluies récentes ont permis des contaminations qui devraient entraîner une extériorisation des taches dans peu de temps. (en incubation actuellement)

Les symptômes sont encore souvent difficile à bien diagnostiquer. (Bien repérer la présence des pycnides)

✓ **L'oïdium :** Souvent présent sur les variétés sensibles mais peu actif.

✓ **Rouille brune :** Apparition de quelques pustules très ponctuellement.

INFO PRESEPT

Les contaminations sont nombreuses sur l'ensemble du réseau. La remontée du risque implique la nécessité d'intervenir dans l'Allier.

☐ ALLIER (Sologne- Bocage- Combrailles)

◆ Semis précoces (1 au 20 octobre)

Risque fort depuis le 15 mai :

→ **traitement déjà conseillé.**

◆ Semis plus tardifs :

Risque moyen à fort si pluie :

→ **traitement à effectuer.**

☐ ALLIER (Val d'Allier)

Risque moyen depuis le 20 mai :

→ **traitement à effectuer rapidement.**

☐ SUD ALLIER + Forterre

◆ Semis précoces :

Risque faible à moyen si pluie :

→ **traitement à effectuer.**

◆ Semis tardifs :

Risque faible.

☐ PUY-DE-DÔME (Limagne)

Risque faible

☐ HAUTE-LOIRE (Brivadois)

Publication mensuelle
Abonnement annuel : 300 Frs
Chèques : Régie de recette D. R. A. F.
Imprimerie D. R. A. F.

D.R.A.F. Service Régional
de la Protection des Végétaux
Marmilhat B.P. 45 - 63370 LEMPDES
Tél : 04.73.42.14.83 - Fax : 04.73.90.83.70



P45



Préconisations

✓ Un traitement visant la septoriose en priorité a déjà été recommandé dans l'Allier (Sologne -Bocage - Combrailles) particulièrement pour les semis d'octobre. Il est aussi conseillé d'intervenir dans les autres secteurs de ce département dès maintenant.

✓ Dans les autres secteurs comme les Limagnes et le Brivadois, il est important de bien apprécier le risque septoriose (présence de taches sur les F3) pour agir si nécessaire, mais la nécessité d'intervenir est encore peu justifié.

Utiliser un fongicide adapté de type triazole à pleine dose (dose homologuée). Tenir compte aussi du potentiel de la culture dans votre décision. Consulter le dépliant vert SPV-ITCF (Fongicides céréales) pour le choix de votre fongicide.

Pucerons des épis

Encore peu fréquent.

Surveiller les cultures, **mais il est inutile d'ajouter un insecticide au fongicide.**

Seuil : un épi sur deux colonisé

TOURNESOL

Pucerons

Une surveillance s'impose dès maintenant surtout sur les parcelles non traitées Gaucho.

Seuils : Avant B5 : 30 à 50 pucerons / plantes
Entre B5 et E1 : 50 à 100 pucerons / plantes.

Phomopsis

La maturation des périthèces progresse variant de 10 à 30 % selon les postes.

Absence de risque pour l'instant.